


LIPOSUCCIÓN DE CUELLO Y/O ROSTRO



Definición: Procedimiento en el que se extrae la grasa que hay en el cuello y el rostro.

Anestesia: principalmente local pero también se puede usar la anestesia general.

Indicación: se realiza en personas que tienen el cuello y/o rostro voluminoso.

Duración de la cirugía: puede ser de 30 a 60 minutos dependiendo de cada caso.

Complemento: para mejorar los resultados se puede realizar liposucción de las mejillas y realizar la bichectomia.

Descripción del procedimiento: se realizan tres incisiones de 2 milímetros ubicadas debajo del lóbulo de las orejas y debajo del mentón, luego se aplica una solución con anestésicos locales y se succiona la grasa con cánulas muy delgadas y pequeñas.

Retiro de puntos: 8 días.

Cuanto duran los resultados: toda la vida, esta grasa no se recupera.

Evolución: puede haber un dolor leve, para el cual se recomendarán analgésicos. Habrá leve edema (hinchazón), que irá disminuyendo en los primeros 8 días. Los morados pueden

durar en promedio 8 días. Se verán irregularidades que corresponden al edema (hinchazón), irán mejorando con las semanas. Habrá sensación de tirantez y flacidez de la piel que irá mejorando a medida que evoluciona la cirugía.

Resultado final: 6 meses.

Flacidez de la piel: la piel es un enmallado de colágeno y elastina que al retirarle la grasa que posee debajo, facilita la retracción de la piel. Algunos pacientes con indicación para lifting de cuello (estiramiento), pueden tener excelentes resultados y no requerir esta cirugía.

Posibles complicaciones:

* Hematomas (acúmulo de sangre en el área operada). * Alteración de la sensibilidad. * Las infecciones son extremadamente raras. * Asimetría de los resultados.

Fórmula

1. Cefalexina 500 mg #15 caps mg
Una cada 8 horas
2. dolex forte # 15 tb
Tres o cuatro al día según dolor

Cuidados posoperatorios

- * Puede tener su alimentación normal cuando llegue a casa.
- * Usar la mentonera 8 días continuos, (pudiendo descansar si lo desea). Luego la usará en el día durante un mes.
- * Se puede bañar normalmente al día siguiente.
- * Tome los medicamentos como lo indica la fórmula.