

OTOPLASTIA

RECOMENDACIONES PRE-QUIRÚRGICAS:

Una cirugía es un proceso de múltiples variables, le solicitamos comprensión en cada una de sus etapas. Traiga un **acompañante** adulto. Tenga su **documento de identidad**. **Ayuno:** si la cirugía se va a realizar con anestesia local puede tener sus comidas en los horarios habituales, pero en pequeña cantidad, para que la pastilla tranquilizante se absorba mejor. Si se va a realizar con anestesia general debe tener un ayuno de 6 horas. **Medicamentos:** los que toma para sus enfermedades crónicas no deben ser suspendidos. **Regreso a casa:** debe salir acompañado. **Presentación personal:** no traiga joyas, piercings, venga en ropa y zapatos cómodos, no aplique maquillaje y remueva pestañas postizas.

RECOMENDACIONES POST-QUIRÚRGICAS:

Fórmula

1. Keflex o Cefalexina 500 mg # 10 tb.
Una cada 12 horas (antibiótico)

2. Dolex Forte # 15 tb.
Tres o cuatro al día para el dolor si el paciente es mayor de edad. Si es menor de edad tomará Dolex simple

Cuidados

* Si la cirugía fué realizada con anestesia local, puede ingerir los alimentos normales. Si fué con anestesia general, consuma alimentos suaves como sopas, jugos, gelatinas. Si hay nauseas o vomito debe esperar.

* Usar el elástico por ocho días, durante las 24 horas. Si hay incomodidad, retírela por periodos cortos para descansar. Luego lo usará durante un mes mientras esté en su hogar.

* No retire ni moje la curación de las orejas.

* En la primera revisión se le cambiará la curación y puede bañarse al día siguiente.

* Evite deportes, actividad física fuerte y bañarse en piscina por 30 días.

Es normal

* Habrá dolor y sensación de pulsación en las orejas.

* La cirugía puede demorar hasta 6 meses para desinflamar.

* Sangrado leve que ensucia un poco los apósitos o el vendaje.

* Equímosis o morados en la parte anterior de la oreja.

* Edema o hinchazon marcado.

Avisar en caso de

* Dolor marcado.

* Fiebre.

* Sangrado abundante.